

# beaphar®

# Canishield®

## Canishield® 1,04 g halsband voor grote honden

### NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  
Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Nederland

### Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Beaphar B.V., Oude Linderteseweg 9, 8102 EV Raalte, Nederland

### BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL:

Canishield® 1,04 g halsband voor kleine en middelgrote honden  
Deltamethrin

### GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDE(E)N(EN):

Zwarte halsband, waaruit wit poeder vrijkomt. Deze halsband van 65 cm (26 g) bevat:

**Werkzaam bestanddeel:**  
Deltamethrin 1,04 g

### INDICATIE(S):

Het diergeneesmiddel:

- Doodt teken (*Ixodes ricinus*) gedurende 6 maanden;
- Doodt vlooiën (*Ctenocephalides felis*) gedurende 16 weken;
- Doodt en weert zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5,5 maanden.

### CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken bij:

- Pups jonger dan 7 weken.
- Honden met huidlaesies.
- Honden met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.
- Katten; deltamethrin is schadelijk voor katten.

### BIJWERKINGEN:

In zeldzame gevallen zijn lokale huidreacties (jeuk, erytheem, haaruitval) in de hals, of van de huid in het algemeen waargenomen. In zeer zeldzame gevallen is afwijkend gedrag (bv. lethargie of hyperactiviteit), vaak geassocieerd met huidirritatie, ook waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn gastro-intestinale symptomen zoals braken, diarree en hypersalivatie (overmatig speeksel) waargenomen.

In zeer zeldzame gevallen zijn neuromusculaire problemen zoals ataxie en spiertremor waargenomen. De symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur na verwijdering van de halsband.

Als een van deze symptomen optreedt, moet de halsband worden verwijderd en wordt geadviseerd contact op te nemen met een dierenarts.

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerkingen gedurende de duur van één behandeling)
- vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)
- soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
- zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde meldingen).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.


### DOELDIERSOORT(EN):

Hond

### DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik op de huid. Eén halsband per hond om de nek bevestigen.

### AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING:



Haal de halsband pas vlak voor aanbrengen uit het beschermende sachet. Bevestig de halsband rond de nek van het dier niet te los en niet te strak: houdt twee platte vingers ruimte tussen de halsband en de nek van de hond. Knip het overvallende gedeelte van de band af (ca. 5cm voorbij de gesp). Controleer regelmatig of de band niet te strak of te los zit en pas indien nodig de lengte aan door de gesp in te knijpen en de band in de juiste positie te schuiven.

### WACHTTIJD(EN):

Niet van toepassing.

### BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN:

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de doos.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking (sachet): direct gebruiken. Bewaar de sachets in de kartonnen doos.

### SPECIALE WAARSCHUWING(EN):

#### Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Aangezien de halsband na één week de volledige werkzaamheid bereikt, dient de halsband bij voorkeur één week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie te worden aangebracht.

Teken en zandvliegen zullen respectievelijk binnen 48 en 24 uur gedood worden en van de gastheer afvallen, zonder een bloedmaaltijd te nuttigen. Het diergeneesmiddel voorkomt niet dat een enkele teek of zandvlieg zich aanhecht. Hierdoor kan een overdracht van besmettelijke ziektes door teken of zandvliegen niet volledig uitgesloten worden.

Voor een optimale controle van vlooiëninfestaties in huishoudens met meerdere huisdieren, moeten alle huisdieren in het huishouden gelijktijdig behandeld worden met een geschikt insecticide.

Vlooiën van huisdieren bevinden zich vaak ook in de manden, bekleding en de gebruikelijke rustplaatsen, zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze dienen dan ook in geval van een massale vlooiëninfestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen behandeld te worden met een geschikt insecticide en door regelmatig stofzuigen.

#### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

In geval van huidlaesies de halsband verwijderen totdat de symptomen zijn verdwenen.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met shampoo op de effectiviteit bij honden.

Incidenteel contact met water vermindert de effectiviteit van de halsband niet.

#### Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Accidentele inname van dit diergeneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder neurotoxische effecten.

Bewaar het diergeneesmiddel in de originele verpakking. Bewaar de halsband in de sachet tot gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens het aanbrengen van de halsband. Vermijd dat kinderen met de halsband spelen of in hun mond stoppen. Gooi eventuele resten of afgesneden stukken van de halsband onmiddellijk weg. Was de handen met koud water na het aanbrengen van de halsband.

Vermijd langdurig contact met de halsband of de hond die de halsband draagt. Laat dieren die de band dragen niet in hetzelfde bed slapen als hun eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen. In geval van accidentele orale blootstelling of inname, dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiters of het etiket te worden getoond.

Deltamethrin kan overgevoeligheds (allergische) reacties veroorzaken bij gevoelige personen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deltamethrin moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Indien er een allergische reactie optreedt, zoek dan medisch advies.

#### Overige waarschuwingen:

Deltamethrin is giftig voor in het water levende organismen. Voorkom dat honden die de halsband dragen oppervlaktewater betreden.

#### Dracht en Lactatie:

Uit laboratoriumonderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogeen- of foetotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet vastgesteld bij drachtige honden. Het diergeneesmiddel bij drachtige en zogende dieren daarom uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

#### Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig gebruiken met andere ectoparasitiden die organofosfaten bevatten.

#### Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband zou opeten, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, tremor, overmatig speeksel, braken, stijfheid van de achterhand. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen 48 uur.

Voor meer informatie over symptomatische behandeling wordt geadviseerd contact op te nemen met uw dierenarts.

#### Onverenigbaarheden:

Niet van toepassing.

### SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL:

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Dit diergeneesmiddel mag niet terecht komen in oppervlaktewater, omdat dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

### DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN:

Augustus 2018

### OVERIGE INFORMATIE:

Verpakkingsgrootten:  
Kartonnen doos met 1 of 2 halsbanden, individueel verpakt in een sachet.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

REG NL 121300

### KANALISATIE

VRU