



LAM

Samenstelling

Magere melkpoeder, Weipoeder
 Plantaardige olie (palm/kokos),
 Tarwebloem, Tarwe-eiwit
 gehydroliseerd, Calcium-
 carbonaat, Magnesiumsulfaat
 Natriumbutyrat, Inuline,
 Eiprodukten gedroogd

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 23,0%
 Ruw vet 23,0%
 Ruwe celstof 0,0%
 Ruwe as 7,5%

Antioxidanten (per kg)

Propylgallaat (E310) 4 mg
 Butylhydroxyanisol
 (BHA, E320) 4 mg

Bevat:

Stikstof (N) 3,61%
 Fosfor (P) 0,68%
 Calcium 1,10%
 Natrium 0,40%

Volledig

Oplosve

Oplosse

een garde

De opgel

Voederin

staltempe

Advies la

Zuigfles:

Dag

1e dag

2e t/m 4

5e t/m 7

8e t/m 1

11e t/m 1

3e week

4e t/m 6

7e week

8e week

Schema is

Na de eers

Netto gew

Bij voorkeu

datum van



LAM

Samenstelling
 Magere melkpoeder, Weipoeder
 Plantaardige olie (palm/kokos),
 Tarwebloem, Tarwe-eiwit
 gehydroliseerd, Calcium-
 carbonaat, Magnesiumsulfaat
 Natriumbutyrat, Inuline,
 Eiprodukten gedroogd

Analytische bestanddelen
 Ruw eiwit 23,0%
 Ruw vet 23,0%
 Ruwe celstof 0,0%
 Ruwe as 7,5%

Antioxidanten (per kg)
 Propylgallaat (E310) 4 mg
 Butylhydroxyanisol
 (BHA, E320) 4 mg

Bevat:

Volledig melkvervanger voor het opfokken van schapen- en geitenlammeren.

Oplosverhouding: schapenlammeren: 1:5 (voor 1 liter melk 165 gr. poeder op 835 gr. water)
geitenlammeren: 1:6 (voor 1 liter melk 145 gr. poeder op 855 gr. water).

Oplossen: los het poeder op in de helft van het benodigde water van 65°C. Klop stevig met een garde. Voeg koud water (20°C) toe totdat de gewenste oplosverhouding is bereikt. De opgeloste melk is een dag houdbaar.

Voeding: verstrek Sprayfo Lam via een lambar (voorraadvoeding, drinktemperatuur is staltemperatuur) of met een zuigfles (drinktemperatuur 40°C).

Advies lambar: geef de eerste dag biest, daarna onbeperkt Sprayfo Lam.

Zuigfles:

Dag	Aantal voedingen	Hoeveelheid per voeding
1e dag	6	100 ml biest
2e t/m 4e dag	6	150 ml Sprayfo Lam
5e t/m 7e dag	5	200 ml Sprayfo Lam
8e t/m 10e dag	4	300 ml Sprayfo Lam
11e t/m 14e dag	3	400 ml Sprayfo Lam
3e week	3	500 ml Sprayfo Lam
4e t/m 6e week	2	800 ml Sprayfo Lam
7e week	2	500 ml Sprayfo Lam
8e week	1	500 ml Sprayfo Lam

Schema is een richtlijn. Zorg bij verhoging van de melkgift voor geleidelijke overgangen. Na de eerste week goed hooi, lammerenkorrels en schoon water ter beschikking stellen.

Netto gewicht per emmer 1,5 kg. Ook verkrijgbaar in zakken. Adviestelefoon 0570-639969. Bij voorkeur te gebruiken voor: zie verpakking. Geproduceerd 9 maanden voor de aangegeven datum van minimale houdbaarheid.

Toevoegingsmiddelen per kg

Nutritionele toevoegingsmiddelen 25.000 I.E.
 Vitamine A (3a672a) 2.000 I.E.
 Vitamine D3 (3a671) 200 mg
 Vitamine E (3a700, all-rac-alfa-tocoferylacetaat) 100 mg
 Vitamine E (3a700, RRR-alfa-tocoferylacetaat) 30 mg
 IJzer als ijzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103) 45 mg
 Mangaan als mangaan(II)sulfaat-monohydraat (3b503) 84 mg
 Zink als zinksulfaat-monohydraat (3b605) 2 mg
 Jodium als kaliumjodide (3b201) 0,2 mg
 Selenium als seleenmethionine geproduceerd door 0,1 mg
 Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (3b8.11)
 Selenium als natriumseleniet (3b801)



Sloten BV
Postbus 474
7400 AL Deventer

000323



10045338

10036315

α-NL09882